

LOMIXIN

Sterile Eye Drops

Prescription Only Medicine

Composition:

Chloramphenicol 0.5%

Therapeutic Activity:

Chloramphenicol is a broad-spectrum antibiotic preparation that exerts mainly a bacteriostatic effect on a wide range of gram positive and gram negative bacteria.

It acts on the inhibition of protein synthesis by interfering with the transfer of activated amino acids from soluble RNA to ribosomes.

Indications:

Lomixin is indicated for the treatment of surface ocular infections involving the conjunctiva and cornea caused by chloramphenicol susceptible organisms.

When should not the medicine be used:

Lomixin is contraindicated in patients sensitive to chloramphenicol.

Side Effects:

In addition to the desired effects of Lomixin, some side effects may occur during the course of treatment, such as:

- Transient burning or stinging.
- Hypersensitivity or inflammatory reactions including contact conjunctivitis and itching.
- Angioneurotic edema occurs rarely in patients who are sensitive to the drug.

Precautions:

The use of chloramphenicol may result in overgrowth of non susceptible organisms including fungi. If superinfection occurs during Lomixin therapy, the eye drops should be discontinued.

Drug Interactions:

If you are using other eye preparations, especially antibiotic eye preparations, notify your physician.

Pediatrics Use:

Use with caution and reduced dosage in premature and full-term infants.

Cautions:

If any hypersensitivity reaction or irritation occurs, Lomixin should be discontinued.

Prolonged or frequent intermittent use of the eye drops should be avoided.

To Avoid Poisoning:

1. Keep the medicine out of the reach of children.
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you
3. Do not induce vomiting without consulting the physician
4. Always notice the expiry date, and never use medicine after the mentioned date
5. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage
6. Do not use your medication in the dark, and always read the label and make sure that you are using the right medication
7. Use only as prescribed. In case any adverse effect develops, discontinue use and consult your physician.

Recommended dosage unless otherwise directed by the physician:

1-2 drops every 3 hours

Administration should be continued day and night for the first 48 hours, afterwards the interval between applications may be increased.

Treatment should be continued for at least 48 hours after the eye appears normal.

Directions for Use:

- Instill drops inside the lower eyelid of the infected eye.
- Remove contact lenses before using this product.
- To avoid contamination, the tip of the dropper should not touch any surface.
- Recap the bottle after each use.

Attention:

This medicine is intended for external use only.

Storage:

Store in refrigerator

Care should be taken not to use the medicine 30 days after opening the bottle.

Presentation:

A bottle of 10 ml sterile solution with a dropper.



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress St.

P.O.Box 58

Beit Jala - Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>

لوميكسين
قطرة للعين

ملزم بوصفة طبية

التركيبية الدوائية:

كلورامفينيكول 0.5%

الفاعلية العلاجية:

كلورامفينيكول هو مضاد حيوي واسع الطيف، يحول دون نمو البكتيريا إيجابية الغرام و سالبية الغرام، يعمل عن طريق تثبيط صناعة البروتين من خلال تعارضه مع نقل الأحماض الأمينية النشطة من الحامض النووي الريبي الذائب (RNA) إلى الرايبوسومات.

الاستعمالات:

تستعمل قطرة العين لوميكسين لعلاج إصابات العين السطحية بما فيها الملتهمة و القرنية الناتجة عن الكائنات الحية التي تتأثر بالكلورامفينيكول.

متى يمنع استعمال الدواء:

يجب عدم استعمال لوميكسين للمرضى الذين لديهم حساسية للكلورامفينيكول.

الأعراض الجانبية:

بالإضافة إلى الفاعلية المرغوبة للدواء لوميكسين، قد تظهر أثناء استعماله بعض الأعراض الجانبية مثل :

- حرقة أو لسعة لحظية .
- إفراط في التحسس أو رد فعل التهابي بما فيها التهاب ملتحة العين و حكة.
- نادرا ما يحدث انتفاخ بالوعاء العصبي لدى المرضى الذين لديهم حساسية من الدواء.

احتياطات:

استخدام الكلورامفينيكول قد يحدث زيادة في نمو الكائنات الحية التي لا تتأثر بالكلورامفينيكول مثل الفطريات، إذا حدث خلال استخدام لوميكسين تضاعف للإصابة، يجب وقف استخدام العلاج.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستخدم دواء آخر للعيون، أعلم طبيبك وخصوصاً إذا كان يحتوي على مضاد حيوي.

الاستخدام لدى الأطفال الخدج و الرضع:

يستخدم بحذر و بجرعات مخفضة للأطفال الخدج والرضع.

تحذيرات:

إذا ظهرت ردود فعل كالإفراط بالتحسس أو تهيج ، فيجب وقف استعمال لوميكسين.

يجب تجنب استخدام قطرات العيون لفترات طويلة أو متقاربة.

لتجنب التسمم:

1. احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال

2. إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ، عليك مراجعة قسم الطوارئ مع أخذ الكمية

المتبقية من العلاج

3. لا تحاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب

4. تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء و لا تستخدم الدواء بعد تاريخ الانتهاء المذكور

5. تجنب تعريض الدواء للحرارة و الرطوبة الشديديتين خلال فترة التخزين

6. لا تستخدم الدواء في الظلام و اقرأ التعليمات لتتأكد أنك تستخدم الدواء الموصوف لك

7. استعمل الدواء كما وصف لك، في حال ظهور أعراض جانبية توقف عن استخدام العلاج

وألعم الطبيب.

الجرعة الدوائية الموصى بها ما لم توجد تعليمات أخرى من الطبيب :

1-2 نقطة كل 3 ساعات

يجب الاستمرار بالعلاج ليلاً و نهاراً أول 48 ساعة، بعدها يمكن زيادة الفترة بين كل استعمال.

يجب متابعة العلاج على الأقل 48 ساعة بعد تحسن الحالة.

طريقة الاستخدام:

- قطر داخل الجفن السفلي من العين المصابة.

- يجب إزالة العدسات اللاصقة قبل الاستخدام.

- لتجنّب التلوّث لا تدع طرف القطارة تلامس أي سطح آخر.
- اعد الغطاء الى العبوة بعد كل استخدام.

تنبيه:

هذا الدواء معد للاستخدام الخارجي فقط.

التخزين:

احفظ الدواء في الثلاجة

يجب الانتباه بعدم استخدام الدواء بعد 30 يوم من تاريخ فتح العبوة.

العبوة:

عبوة تحتوي على 10 مليلتر سائل معقم مع قطارة.



شركة بيت جالا لصناعة الأدوية

شارع المدارس رقم 81

ص . ب 58

بيت جالا- فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>

1408015-3