

# DeeDense

## Oral drops

### **Composition:**

Each drop contains:

Vitamin D<sub>3</sub> (as Cholecalciferol) 400 I.U.

### **Therapeutic Activity:**

Vitamin D<sub>3</sub> supplement.

### **Indications:**

- 1- Enhancing the growth and development in infancy and childhood especially for normal bone growth and muscle strength
- 2- Maintaining healthy bones and teeth
- 3- Supporting proper functioning of the nervous and immune systems and preventing infection.

### **When This Preparation Should Not Be Used:**

DeeDense is contraindicated in the following conditions:

- Known hypersensitivity to Cholecalciferol
- Patients with hypercalcemia.

### **Precautions**

- If you are pregnant, or breast-feeding
- If you are Diabetic, hypoglycemic, or have liver disease, kidney diseases, heart diseases, primary hyperthyroidism, sarcoidosis, tuberculosis and lymphoma.

### **Side Effects:**

In addition to the desired effects of DeeDense, some side effects may appear such as: Thirst, metal taste, poor appetite, weight loss, bone pain, tiredness, sore eyes, itchy skin, nausea, vomiting, diarrhea, constipation, a frequent need to urinate and muscle problems.

### **To Avoid Poisoning:**

1. Keep the medicine out of the reach of children
2. If an excessive dose is taken, or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you
3. Do not induce vomiting without consulting the physician
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are taking the right medication
5. Always notice the expiry date and never take the medicine after the mentioned date
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in this leaflet develops, discontinue use and consult your physician.

### **Dosage and Directions for Use:**

- Infants less than 1 year old: Preferably, place 1 drop daily in the mouth, or mix one drop daily with milk, or juice
- Children and adults more than 1 year of age: One drop daily after meals and preferably at bedtime to avoid missing the dose and interactions with other medications
- Use the dropper enclosed to ensure that you are taking the proper dose.

**Storage:**

Store at temperature below 25°C, protect from heat, moisture and light. Keep the bottle tightly closed.

**Presentation:**

Glass bottle 10 ml. A dropper is enclosed.



**Beit Jala Pharmaceutical Co.**

81, Al-Madaress St.

P.O.Box 58

Beit Jala - Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>

# دي دنس نقط بالفم

## التركيبية الدوائية:

كل نقطة تحتوي على:  
فيتامين د<sub>3</sub> (كوليالكاليفيرول) ٤٠٠ وحدة دولية .

## الفاعلية العلاجية:

مكملات غذائية.

## الاستعمالات:

- ١- تحسين النمو و التطور في سن الرضاعة و الطفولة خاصةً النمو الطبيعي للعظام و لقوة العضلات
- ٢- المحافظة على اسنان وعظام صحية
- ٣- دعم عمل الجهاز العصبي والمناعة بشكل صحيح ولمنع العدوى.

## متى يمنع استعمال هذا العلاج:

- يمنع استخدام دي دنس في الحالات التالية:
- وجود حساسية معروفة كوليالكاليفيرول
  - المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم.

## الإحتياطات:

- إن كنت حاملاً، أو مرضع
- إذا كنت مريض سكري أو كنت تعاني من أمراض الكبد، أمراض الكلى ، أمراض القلب ، فرط في نشاط الغدة الدرقية الابتدائية، داء بووك ، السل وسرطان الغدد الليمفاوية.

## الاعراض الجانبية:

بالإضافة إلى آثار دي دنس الإيجابية هناك بعض التأثيرات الجانبية التي قد تظهر مثل: العطش، طعم معدني ، فقدان الشهية، فقدان الوزن، ألم في العظام، التعب، التهاب العيون، حكة في الجلد، تقيؤ، إسهال، إمساك، الحاجة المتكررة للتبول ومشاكل في العضلات.

## لتجنب التسمم:

- ١ . احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الاطفال
- ٢ . إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ، يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع أخذ الكمية المتبقية من الدواء
- ٣ . لا تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب
- ٤ . لا تتناول دواءك في الظلام وقرأ التعليمات لتتأكد انك تستخدم الدواء الموصوف لك
- ٥ . تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء ولا تأخذ الدواء بعد تاريخ الإنتهاء المذكور
- ٦ . تجنب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديتين خلال فترة التخزين
- ٧ . تناول الدواء حسب الوصفة فقط. في حالة ظهور أي أعراض جانبية غير واردة في النشرة، توقف عن استخدام العلاج واعلم طبيبك.


## الجرعة وتعليمات الاستخدام:

- الرضع أقل من عمر السنة: من المفضل القيام بوضع نقطة واحدة في الفم. أو قم بخلط نقطة واحدة يومياً مع الحليب، أو العصير
- الأطفال و البالغين أكبر من عمر السنة: نقطة واحدة يومياً بعد الاكل، ويفضل عند النوم لتجنب نسيان الجرعة والتفاعلات مع الادوية الأخرى
- استخدم القطارة المرفقة لتتأكد من تناولك للجرعة الصحيحة.

## التخزين:

احفظ المستحضر على درجة حرارة ما بين ١٥-٣٠ م° ، بعيداً عن الحرارة ، الرطوبة و الضوء. احفظ العبوة محكمة الاغلاق.

**العبوة:**  
عبوة زجاجية تحتوي على ١٠ مل. مرفق قطارة.

 **شركة بيت جالا لصناعة الأدوية**

شارع المدارس رقم ٨١  
ص . ب ٥٨  
بيت جالا – فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>