

KOLIK

Oral Drops

Prescription Only Medicine

Composition:

Each ml contains:

Hyoscyamine Sulfate 0.125 mg

Therapeutic Activity:

Antispasmodic drug

Indications:

Kolik is indicated to treat a variety of stomach/ intestinal problems such as cramps, infant colic and irritable bowel syndrome.

When should not this preparation be used:

Kolik oral drops is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any ingredient of the drug.

Side Effects:

In addition to the desired effects of Kolik oral drops, some side effects may occur during the course of treatment such as:

Dizziness, drowsiness, blurred vision, dry mouth, vision problems, headache, trouble sleeping, constipation, flushing, dry skin.

Drug Interactions:

If the infant is taking another medicine concomitantly or if he/ she has just finished treatment with another medicine, the physician should be informed in order to prevent hazards and lack of efficacy resulting from drug interactions.

To Avoid Poisoning:

1. Keep the medicine out of the reach of children.
2. If an excessive dose is taken, or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you.
3. Do not induce vomiting without consulting the physician.
4. Do not give your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the right medication.
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date.
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage.
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in the leaflet develops, discontinue use and consult the physician.

Dosage and Directions for Use:

The dose is according to physician's instructions only.

Kolik is administered 30-60 minutes before meals or as directed by the physician.

Missed Dose:

- The missed dose should be administered as soon as you remember, unless it is the time for the next dose, skip the missed dose and continue as the regular dose schedule.
- Do not double the dose to make up the missed dose.

Storage:

Store at a temperature between 15-30°C.

Presentation:

A 10 ml plastic bottle with a dropper.



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress St.

P.O.Box 58

Beit Jala - Palestine

[http: //www.beitjalapharma.com](http://www.beitjalapharma.com)

كوليك

نقط في الفم

ملزم بوصفة طبية

التركيبة الدوائية:

يحتوي المليتر الواحد على:
هيسيامين سولفات ٠,١٢٥ , ملغم

الفاعلية العلاجية:

مضاد للتشنجات

دواعي الاستعمال:

يستعمل كوليك لعلاج حالات مختلفة من المشاكل المعوية مثل التشنجات، مغص الرضع والأطفال، ومرض تهيج الأمعاء.

متى يمنع استعمال هذا العلاج:

يمنع استخدام كوليك للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة لأي من مكونات الدواء .

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات العلاجية المرغوبة لكوليك، قد تحدث بعض الاعراض الجانبية خلال فترة العلاج مثل: الدوخة، خمول، تشوش الرؤية، جفاف في الفم، مشاكل في الرؤية، صداع، صعوبة في النوم، إمساك، احمرار الجلد، جفاف الجلد.

التفاعلات بين الادوية:

إذا كان هناك دواء آخر موصوف للرضيع في نفس الوقت او انتهى مؤخراً من العلاج بدواء آخر، يجب اعلام الطبيب بذلك لتجنب المخاطر وقلة نجاعة العلاج التي تنتج من التفاعلات بين الادوية.

لتجنب التسمم:

1. احفظ الادوية بعيداً عن متناول ايدي الاطفال .
2. اذا تناولت جرعة زائدة او اذا تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ ،يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء.
3. لا تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب.
4. لا تعط دواءك في الظلام ، واقرأ التعليمات لتتأكد انك تستخدم الدواء المناسب.
5. تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء، ولا تستخدم الدواء بعد تاريخ الانتهاء المذكور.
6. تجنب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديديتين خلال فترة التخزين.
7. اعط الدواء حسب الوصفة فقط. في حالة ظهور أي اعراض جانبية غير واردة في النشرة، توقف عن استخدام العلاج واعلم الطبيب.

الجرعة الدوائية وتعليمات الاستخدام:

تعطى الجرعة الدوائية حسب إرشادات الطبيب فقط.
يعطى كولييك قبل وجبات الطعام ب ٣٠-٦٠ دقيقة أو حسب تعليمات الطبيب.

في حال نسيان الجرعة:

- يجب اعطاء الجرعة المنسية فور تذكر ذلك مالم يكن قد حان موعد الجرعة التالية، و لكن إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فيجب ترك الجرعة المنسية واكمال الجرعات حسب جدول الجرعات الاعتيادي.
- يجب عدم مضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة المنسية.

التخزين:

احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين ١٥ - ٣٠°م.

العبوة:

عبوة بلاستيكية سعة ١٠ مل مع قطارة.



شركة بيت جالا لصناعة الأدوية

شارع المدارس رقم 81

ص . ب 58

بيت جالا - فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>