

PERMICIDE CREAM

Prescription Only Medicine

Composition:

Permethrin 5% w/w.

Therapeutic Activity:

Scabicide.

Indications:

Permicide cream is indicated for the treatment of infestation with *Sarcoptes scabiei* (scabies).

When Should Not This Preparation Be Used:

Permicide cream is contraindicated in the following conditions:

- Hypersensitivity to permethrin or to other pyrethroids or pyrethrin
- Infants under 2 months old.

Precautions:

- Permicide cream is for external use only. Use gloves if you apply the cream to other persons
- Avoid eye contact with this medicine; in the event of accidental contact, rinse immediately with water
- Permicide cream may cause breathing difficulty or an asthmatic episode in patients with a history of asthma.

Warnings:

- Avoid applying cream on open wounds or cuts
- Avoid sexual contact until you have cleared up
- Avoid sharing bedding, clothing and other articles of personal use with others as scabies is highly contagious
- This cream is usually given as single application, if necessary, a second application may be done but not less than 7 days after the initial application.

Side Effects:

In addition to the desired effects of Permicide cream, some side effects may occur during course of treatment such as: Temporary redness of the skin, itching, burning or stinging, erythema .The itching effect usually disappears within about 4 weeks.

Call your physician at once if those side effects worsen or become severe or if forceful scratching, edema, pus or eczema occur.

See medical emergency if signs of allergic reactions occur (hives, difficulty in breathing, swelling of face, tongue or throat).

Drug Interactions:

If you are taking or applying another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, inform your physician in order to prevent hazards and lack of efficacy resulting from drug interactions. This is especially important for the following drugs: corticosteroids.

Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before Starting Treatment:

- Children less than 2 years old
- If you are pregnant, breast-feeding or planning to become pregnant. As nursing mothers are advised to discontinue breast feeding temporarily during treatment or with holding the drug
- If you have history of skin infections or asthma
- If you are taking corticosteroids type medicines.

To Avoid Poisoning:

1. Keep the medicine out of the reach of children
2. If a child swallowed the medicine accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you
3. Do not induce vomiting without consulting the physician
4. Excessive application of drug is not advisable as it might result in increased irritation and erythema, you should apply the labelled dose only.
5. Do not apply the medicine in the dark, always read the label and make sure you are using the right medication
6. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date
7. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage
8. Use the medicine only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in this leaflet develops, discontinue use and consult your physician.

Dosage And Directions For Use:

1. Use Permicide cream as directed by your physician only
2. Before applying Permicide cream make sure the skin is clean, cool and dry
3. For adults and children over 2 years, apply cream to the whole body from the neck down, rubbing lightly into the skin until it disappears. Don't forget to cover all skin surfaces, including between the fingers and toes, palms, under the nails, on the soles of the feet as well as wrists, buttocks and genitals
4. For babies over 2 months to 2 years, apply also to the face, neck, ears and scalp, avoiding only the areas immediately around the eyes, ears, nostrils, mouth and vagina
5. Leave the cream on for at least 8 hours before washing off with soap and water, but no longer than 12 hours. Ideally, apply the cream before going to bed and wash off in the shower the next morning
6. If applied during the day, reapply to any area which may be washed during the 8 hours treatment time. Try to avoid exposure to the sun
7. The allergic symptoms may remain for a week or two after the mites have been killed. If this is a problem you ask your physician about other medications that may soothe itching
8. Clothing and bed lines that have been in contact with your skin less than 2 days before treatment, should be machine washed with hot water and dried in hot dryer for 20 minutes, dry cleaned or removed from body contact for 72 hours.

How Can You Contribute To The Success Of The Treatment?

For complete treatment and to prevent reinfection:

1. You must treat your environment (clothing, pillows, bedding,...etc)at the same time as you treat your body.
2. People who are in close contact with the infected person such as members of the same house hold, should also be checked for scabies by physician.

Attention:

- Avoid contact with eyes, ears, nostrilles, mouth and vagina
- For external use only
- For topical use only
- Don't swallow this medicine.

Storage:

Store at temperature between 15-25°C, protect from freezing.

Presentation:

A tube of 30 g cream.



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress St.

P.O. Box 58

Beit Jala - Palestine

[http: //www.beitjalapharma.com](http://www.beitjalapharma.com)

١٤٠٩١٢٥-٠

بيرميسيد كريم

ملزم بوصفة طبية

التركيبة الدوائية:

بيرميثرين ٥٪ / وزن/وزن.

الفاعلية العلاجية:

مضاد للجرب.

الاستعمالات:

يستخدم بيرميسيد كريم لعلاج الإصابة بالجربية القارمة (الجرب).

متى يمنع استعمال هذا العلاج:

- يمنع استخدام بيرميسيد كريم في الحالات التالية:
- وجود حساسية للبيرميثرين أو البيريثرويد أو البيريثرين
- الرضع الذين تقل اعمارهم عن شهرين.

الاحتياطات:

- بيرميسيد كريم للإستخدام الخارجي فقط. استخدم القفازات عند وضع الكريم لأشخاص آخرين
- تجنب ملامسة الدواء للعينين ،وإن حدث ذلك عرضياً، يجب غسلها بالماء فوراً
- بيرميسيد كريم قد يسبب صعوبة في التنفس أو نوبة ربو للمرضى الذين لديهم تاريخ من الربو.

تحذيرات:

- تجنب وضع الكريم على الجروح المفتوحة أو المبتورة
- تجنب عملية الجماع حتى يتم شفاؤك
- تجنب مشاركة الفراش، الملابس وغيرها من المواد للإستخدام الشخصي مع الآخرين لأن الجرب مرض معد للغاية
- عادة يعطى هذا الكريم للإستخدام مرة واحدة، إذا لزم الأمر ، يمكن إعادة الإستخدام للمرة الثانية ولكن لا يقل عن ٧ أيام بعد الإستخدام لأول مرة.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات العلاجية المرغوبة لكريم بيرميسيد ، قد تحدث بعض الأعراض الجانبية خلال فترة العلاج مثل: احمرار مؤقت في الجلد، حكة، حرق أو وخز، إحمرار البشرة.
تختفي ظاهرة الحكة عادة خلال ٤ أسابيع تقريباً.
أعلم طبيبك حالاً إذا أي من الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه ساءت أو أصبحت حادة أو إذا حدثت حكة قوية، وذمة، قيح أو الاكزيما.
توجه الى قسم الطوارئ إذاحدث أي من أعراض الحساسية (شرى ، صعوبة في التنفس، انتفاخ في الوجه ،اللسان، أو الحلق).

التفاعلات بين الادوية:

إذا كنت تتناول أو تضع دواءً آخرًا في نفس الوقت أو كنت قد انتهيت مؤخراً من العلاج بدواء آخر، فاعلم طبيبك بذلك لتجنب المخاطر وقلعة نجاعة العلاج التي تنتج من التفاعلات بين الادوية. هذا مهم خاصة للأدوية التالية: الكورتيكوستيرويدات.

لا تستخدم هذا الدواء دون استشارة طبيبك قبل بدء العلاج:

- الأطفال الذين تقل اعمارهم عن سنتين
- إذا كنت حاملاً، مرضعة، أو تخططين لأن تصبحي حاملاً. كما وينصح الأمهات المرضعات إلى وقف الرضاعة مؤقتاً أثناء العلاج أو وقف الدواء
- إذ سبق وعانيت من التهابات الجلد أو الربو
- إذا كنت تأخذ أدوية من نوع كورتيكوستيرويدات.

لتجنب التسمم:

١. احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الاطفال
٢. إذا تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ، يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع أخذ الكمية المتبقية من الدواء
٣. لا تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب
٤. لا ينصح باستخدام جرعة زائدة من الدواء لأنه قد يؤدي الى زيادة التهيج والاحمرار، يجب استخدام الجرعة الموصى بها فقط
٥. لا تستخدم الدواء في الظلام وقرأ التعليمات لتتأكد انك تستخدم الدواء الموصوف لك
٦. تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء ولا تأخذ الدواء بعد تاريخ الإنتهاء المذكور
٧. تجنب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديتين خلال فترة التخزين
٨. استخدم الدواء حسب الوصفة فقط. في حالة ظهور أي أعراض جانبية غير واردة في النشرة، توقف عن استخدام العلاج واعلم طبيبك.

الجرعة وتعليمات الاستخدام:

١. استخدم بيرميسيد كريم حسب تعليمات طبيبك فقط
٢. قبل وضع بيرميسيد كريم ، تأكد من أن الجلد نظيف، بارد وجاف
٣. للبالغين والأطفال أكثر من سنتين، ادهن الكريم على الجسم كله من الرقبة إلى أسفل، افرك برفق على الجلد حتى يختفي. لا تنسى تغطية جميع سطوح الجلد، بما في ذلك بين أصابع اليدين والقدمين، الراحتين، تحت الأظافر، على باطن القدمين وكذلك الرسغين والأرداف والأعضاء التناسلية
٤. الأطفال الرضع أكثر من شهرين إلى سنتين، ادهن أيضاً على الوجه، الرقبة، الأذنين وفروة الرأس، وتجنب المناطق التي حول العينين، الأذنين، فتحتي الأنف الأماميتين، الفم والمهبل
٥. اترك الكريم ما لا يقل عن ٨ ساعات قبل غسله بالماء والصابون، على ان لا يتاخر عن ١٢ ساعة. ومن الناحية المثالية، ادهن الكريم قبل الذهاب إلى الفراش واغسله بالاستحمام في صباح اليوم التالي
٦. إذا ما وضع الكريم خلال النهار، يجب إعادة وضعه إلى أي منطقة تم غسلها خلال ٨ ساعات من بدء العلاج. حاول تجنب التعرض لأشعة الشمس
٧. أعراض الحساسية قد تبقى لمدة أسبوع أو اثنين بعد قتل العث. إذا كانت هذه مشكلة، أسأل طبيبك عن أدوية أخرى التي قد تخفف الحكة
٨. الملابس و أغطية الفراش الملامسة لبشرتك قبل يومين على الأقل من العلاج، يجب غسلها بالماء الساخن وتجفف باستخدام مجفف ساخن لمدة ٢٠ دقيقة. يجب تنظيفها بشكل جاف أو التخلص منها إذا كانت ملامسة لجسمك لمدة ٧٢ ساعة.

كيف تستطيع أن تساهم في نجاح العلاج؟

للحصول على العلاج بشكل كامل ومنع الإصابة مرة أخرى:

١. يجب علاج البيئة الخاصة بك (الملابس، الوسائد، الفراش، ... الخ) في نفس فترة علاجك لجسمك
٢. الأشخاص الذين على اتصال مباشر مع الشخص المصاب مثل أفراد من نفس المنزل، يجب أيضاً عمل فحص الجرب لهم من قبل الطبيب.

تنبيه:

- تجنب ملامسة الدواء للعينين، الأذنين، فتحتي الأنف الأماميتين، الفم والمهبل
- للإستخدام الخارجي فقط
- للإستخدام الموضعي فقط
- لا تقم ببلع هذا الدواء.

التخزين:

احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين ١٥-٢٥ م°، بعيداً عن التجميد.

العبوة:

أنبوب يحتوي على ٣٠ غم كريم.



شركة بيت جالا لصناعة الأدوية

شارع المدارس رقم ٨١

ص ب ٥٨

بيت جالا - فلسطين

http:

١٤٠٩١٢٥-0

//www.beitjalapharma.com