

# ZYDEX-B CREAM

## **Prescription Only Medicine.**

### **Composition:**

Fusidic acid	2 % w/w
Betamethasone (as valerate)	0.1 % w/w
Methyl paraben as preservative.	

### **Therapeutic Activity:**

Topical antibacterial and anti-inflammatory agent.

### **Indications:**

Zydex-B cream is indicated for treatment of atopic eczema and dermatitis where bacterial infection sensitive to fusidic acid is present.

### **When should not the product be used:**

- If you have known hypersensitivity to Fusidic acid, Betamethasone valerate or to any other ingredient of the drug.
- In bacterial infection due to non-susceptible organisms to Zydex-B, viral and fungal skin infections, tuberculosis, perioral dermatitis, acne rosacea, acne vulgaris, syphilitic skin infection and ulcerative condition.

### **Side Effects:**

In addition to the desired effects of Zydex-B, some side effects may occur during the course of treatment such as: Pain (when applied to deep leg ulcers), transient skin irritation, stinging or burning sensation, pruritus, rash and worsening of eczema, erythema, urticaria, skin atrophy, striae, telangiectasia and super infection.

### **Precautions:**

- Consult your physician if any infection spreads, or if after seven days of treatment there is little or no improvement in your symptoms.
- Do not use this product on open wounds.
- Avoid contact with eyes and the moist membranes lining the inside of certain parts of the body e.g. mouth, nasal passages. Rinse with cold water if accidental contact occurs.
- Wash your hands thoroughly after applying this product, unless the hands are the area being treated.

### **Drug Interactions:**

If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another drug inform your physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy resulting from drug interaction. This is especially important if you are using another medicines on skin.

**Do not take this medicine without consulting the physician before starting treatment:**

- If you are pregnant, breast feeding or planning to become pregnant.
- If you have any of the following conditions:  
Atrophic skin, cutaneous ulcers, fragility of the skin veins and perianal and genital pruritus.
- In children under 3 years of age.

**To Avoid Poisoning:**

1. Keep the medicine out of the reach of children.
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you.
3. Do not induce vomiting without consulting the physician
4. Do not use your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the right medication.
5. Always notice the expiry date, and never use medicines after that date.
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage.
7. Use the drug only as prescribed. In case any adverse effect develops which is not mentioned in this leaflet, discontinue use and consult your physician.

**Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician:**

- Zydex-B cream should be applied topically into the affected area 2-3 times daily
- Do not cover the affected area, unless directed by your physician, if so the skin should be cleansed before a fresh dressing is applied & less frequent application may be adequate.

**Missed Dose:**

Apply Zydex-B cream as soon as you remember, but never use if it is almost time for the next application.

**Directions for Use:**

- Apply sparingly a thin film and rub gently into the affected area.
- Do not cover the affected area, unless directed by your physician.
- Do not interrupt the period of treatment prescribed to you by yourself.
- The treatment period should not exceed two weeks, unless directed by the physician.

**Attention:**

For external use only.

**Storage:**

Store at temperature between 15 – 30 °C, protect from freezing.

**Presentation:**

A tube of 15 g cream.



**Beit Jala Pharmaceutical Co.**

81, Al-Madaress St.

P.O.Box 58

Beit Jala - Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>

# زايدكس- ب كريم

ملزم بوصفة طبية

## التركيبية الدوائية:

حامض الفيوسيد	2% وزن / وزن
بيتاميثازون (على شكل فاليرات) 0.1% وزن / وزن	
ميثيل بارابين كمادة حافظة.	

## الفاعلية العلاجية:

مضاد بكتيري ومضاد التهابات موضعي.

## الاستعمالات:

يستعمل زائدكس- ب لعلاج الاكزيما والالتهابات الجلدية التي تسببها البكتيريا الحساسة لحمض الفيوسيد

## متى يمنع استخدام هذا الدواء:

- إذا كنت تعاني من وجود حساسية لحمض الفيوسيد، بيتاميثازون فاليرات أو لأي مكونات أخرى للدواء.
- إذا كنت تعاني من إصابة بكتيرية نتيجة كائنات حية غير حساسة لمستحضر زائدكس- ب، اصابات جلدية نتيجة فيروس أو فطريات، التدرن الجلدي، التهاب جلدي حول الفم، العُد الوردي، حب الشباب، الإصابة الجلدية بالسفلس والحالات التي تصاحبها تقرحات جلدية.

## الأعراض الجانبية:

إضافة الى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء قد تظهر بعض الاعراض الجانبية خلال فترة العلاج مثل: ألم (عندما يوضع على التقرحات العميقة في الأرجل)، تهيج جلدي مؤقت، شعور بالسخونة أو اللسع، حكة، طفح جلدي وتفاقم حالة الاكزيما، احمرار، الشرى، ضمور الجلد، خطوط بيضاء في الجلد، توسع الأوعية الشعرية و إصابة مضاعفة.

## احتياطات:

- استشر طبيبك في حال انتشار العدوى، أو في حال قلة أو عدم تحسن الأعراض بعد سبعة أيام من العلاج.
- لا يستخدم المستحضر على الجروح المفتوحة.
- تجنب ملامسة المستحضر للعينين والأغشية الرطبة المبطنة داخل اجزاء معينة من الجسم مثل: الفم والأنف. إذا حدث ملامسة عن طريق الخطأ اشطف المنطقة المصابة بالماء البارد.
- اغسل يديك جيدا بعد استعمال المستحضر، إلا في حال كون اليدين هما المنطقة المراد معالجتها.

## التفاعلات الدوائية:

إذا كنت تستخدم دواءً آخرًا أو إذا انتهيت حديثاً من استخدام دواءً آخرًا اعلم طبيبك بذلك لمنع أي أضرار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات الدوائية هذا مهم خاصة إذا كنت تستعمل ادوية اخرى على الجلد.

## لا تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

- إذا كنت حاملاً، مرضعاً أو تخططين للحمل.
- إذا كنت تعاني من احدى الحالات التالية:
- ضمور في الجلد، تقرحات جلدية، هشاشة الأوردة الجلدية ، وحكة جلدية حول الشرج والاعضاء التناسلية.
- لدى الأطفال دون الثالثة من العمر.

## لتجنب التسمم:

1. احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
2. إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء.
3. لا تحاول تحفيز القيء دون استشارة الطبيب.
4. لا تستعمل دواءك في الظلام واقرأ التعليمات لتتأكد انك تستعمل الدواء المناسب.
5. تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء ولا تستعمل الدواء بعد هذا التاريخ.
6. يجب عدم تعريض الدواء لدرجة حرارة عالية أو رطوبة عالية خلال فترة التخزين.
7. استعمل الدواء حسب الوصفة فقط، في حالة ظهور أي اعراض جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، توقف عن استعمال الدواء واستشر طبيبك.

## الجرعة الدوائية الموصى بها ما لم توجد تعليمات اخرى من قبل الطبيب:

- يستخدم زايدكس- ب كريم موضعياً على المنطقة المصابة 2-3 مرات يومياً.
- لا تقم بتغطية المنطقة المصابة إلا إذا أشار الطبيب إلى ذلك، في تلك الحالة يجب تنظيف الجلد قبل تغطيته كما ان تقليل عدد مرات استخدام المستحضر ممكن ان يكون كافي.

## في حال نسيان الجرعة:

استخدم زايدكس- ب كريم حال تذكرك ذلك ما لم يكن موعد الجرعة التالية قد حان.

## تعليمات الاستخدام:

- ضع طبقة رقيقة وافركها برفق على المنطقة المصابة.
- لا تقم بتغطية المنطقة المصابة إلا إذا أشار طبيبك إلى ذلك.
- لا توقف فترة العلاج الموصوفة لك من تلقاء نفسك.
- يجب ان لا تتجاوز الفترة العلاجية أسبوعين الا إذا أشار الطبيب خلاف ذلك.

تنبيه:

للاستعمال الخارجي فقط.

التخزين:

احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 15-30°م، بعيدا عن التجميد.

العبوة:

أنبوب يحتوي على 15 غم كريم.



شركة بيت جالا لصناعة الأدوية

شارع المدارس رقم 81

ص . ب 58

بيت جالا - فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>

1409110-1