

ZYDEX-HC CREAM

Prescription Only Medicine.

Composition:

Fusidic Acid 2% w/w

Hydrocortisone acetate 1% w/w

Preservative: Methyl paraben

Therapeutic Activity:

Topical antibacterial and anti-inflammatory agent.

Indications:

Zydex-HC is indicated as an anti-inflammatory in dermatoses where bacterial infection sensitive to fusidic acid is present or likely to occur.

When should not the product be used:

- Zydex-HC is contraindicated in patients with known hypersensitivity to fusidic acid, hydrocortisone acetate or any other ingredient of the drug.
- Zydex-HC is contraindicated in bacterial infections due to non-susceptible organisms, fungal infections, tuberculosis of the skin, syphilitic skin infections, chicken pox, eruption following vaccinations and viral diseases of the skin in general.

Side Effects:

In addition to the desired effects of Zydex-HC, some side effects may occur during the course of treatment such as: Pain (when applied to deep leg ulcers), swelling, rash, dryness on the treated area, itching, burning, local irritation, striae, skin atrophy, atrophy of subcutaneous tissues, telangiectasia, change in pigmentation and secondary infection.

Precautions:

- Zydex-HC should not be used in or near the eye because of the possibility of conjunctival irritation by fusidic acid. Application of topical corticosteroids near the eye can potentially cause increased intraocular pressure, glaucoma, or cataracts.
- Avoid contact with mucous membranes.

Drug Interactions:

If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another drug, inform your physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy resulting from drug interactions.

Do not use this medicine without consulting a physician before starting treatment:

- If you are pregnant, breast-feeding or planning to become pregnant.
- In children under 3 years of age.

Warnings:

- Treatment with Zydex-HC should not be continued for more than 14 days in the absence of any clinical improvement, since occult extensions of the infection may occur due to masking by steroid. Similarly, steroids may also mask hypersensitivity reactions.
- Continuous treatment for longer than three weeks should be avoided in patients under three years of age because of the risk of adrenocortical suppression.

To Avoid Poisoning:

1. Keep the medicine out of the reach of children.
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine with you.
3. Do not induce vomiting without consulting the physician.
4. Do not apply your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the right medication.
5. Always notice the expiry date, and never use the medicine after the mentioned date.
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage.
7. Use the drug only as prescribed. In case any adverse effect develops, discontinue use and consult your physician.

Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician:

Zydex-HC cream should be applied topically into the affected area one to four times daily, or as required.

Missed Dose:

Apply Zydex-HC cream as soon as you remember, but never use if it is almost time for the next application.

Directions for Use:

- Apply sparingly a thin film and rub gently into the affected area.
- Do not cover the affected area, unless directed by the physician.
- Do not interrupt the period of treatment prescribed to you by yourself.

Attention:

For external use only.

Storage:

Store at a temperature between 15 – 30°C, protect from freezing.

Presentation:

A tube of 15 g cream.



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Al-Madaress Str.

P.O.Box 58

Beit Jala-Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>

زايدكس- اتش سي كريم

هذا الدواء ملزم بوصفة طبية

التركيبة الدوائية:

حامض الفيوسيد 2% وزن / وزن
هايدروكورتيزون اسيتات 1% وزن / وزن
ميثيل بارابين كمادة حافظة.

الفاعلية الدوائية:

مضاد بكتيري و مضاد للالتهابات موضعي.

الاستخدامات:

يستخدم زایدكس- اتش سي كريم لعلاج الالتهابات الجلدية في حال وجود أو احتمال الإصابة بالبكتيريا الحساسة للمادة الفعالة.

متى يمنع استخدام هذا الدواء:

- يمنع استخدام زایدكس- اتش سي كريم للمرضى الذين يشكون من حساسية معروفة لحامض الفيوسيد، هايدروكورتيزون اسيتات أو لأي مكونات أخرى للدواء.
- كما يمنع استخدامه أيضاً في العدوى البكتيرية التي تسببها كائنات غير حساسة للدواء، العدوى الفطرية، التدرن الجلدي، السفلس الجلدي، الجدري، الطفح الناتج عن التطعيم، وكذلك الامراض الجلدية الفيروسية بشكل عام.

الاعراض الجانبية:

الى جانب التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء قد تحدث بعض الأعراض الجانبية خلال فترة العلاج مثل: ألم (عندما يوضع على التقرحات العميقة في الأرجل)، انتفاخ، طفح جلدي، جفاف المنطقة المعالجة، حكة، حرقة، تهيج موضعي، خطوط بيضاء في الجلد، ضمور في الجلد أو الانسجة تحته، تبقع ناتج عن توسع الشعيرات الدموية، تغير لون الجلد، و حدوث عدوى ثانوية.

احتياطات:

- يجب ان لا يوضع زایدكس- اتش سي كريم في العين أو بالقرب منها لأن حامض الفيوسيد قد يسبب تهيج الملتحمة. كما ان استخدام الستيرويدات الدهنية موضعياً قرب العين قد يسبب زيادة الضغط الداخلي للعين أو الزرق أو عتم عدسة العين.
- تجنب وصول الكريم للأغشية المخاطية.

التفاعلات الدوائية:

إذا كنت تتعاطى دواءً آخرًا أو إذا انتهيت حديثاً من استخدام دواء آخر، اعلم طبيبك بذلك لمنع أي أضرار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات الدوائية.

لا تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

- إذا كنت حاملاً، مرضعاً، أو تخططين للحمل.
- للأطفال دون سن الثالثة من العمر.

تحذيرات:

- العلاج بالزايدكس- اتش سي يجب أن لا يستمر أكثر من 14 يوم في حال عدم تحسن الالتهاب، لان من الممكن استمرار امتداد العدوى بشكل مخفي بفعل الستيرويدات. و بالمثل قد تخفي الستيرويدات تفاعلات الحساسية.
- يجب عدم استمرار العلاج لأكثر من ثلاث أسابيع للمرضى الذين هم أقل من 3 سنوات وذلك بسبب خطر تثبيط عمل الغدة الكظرية.

لتجنب التسمم:

1. احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
2. إن تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ، يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء.
3. لا تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب.
4. لا تستخدم دواءك في الظلام وقرأ التعليمات لتتأكد انك تستخدم الدواء الموصوف لك.
5. تأكد دائماً من تاريخ نهاية صلاحية الدواء ولا تستخدم الدواء بعد تاريخ الانتهاء المذكور.
6. تجنب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديتين خلال فترة التخزين.
7. استخدم الدواء حسب الوصفة فقط، في حال ظهور أي أعراض جانبية، توقف عن استخدام العلاج واعلم طبيبك.

الجرعة الموصى بها ما لم توجد تعليمات اخرى من قبل الطبيب:

يستخدم زايدكس- اتش سي كريم موضعياً على المنطقة المصابة مرة إلى اربع مرات يوميا، أو حسب الحاجة.

في حال نسيان الجرعة:

استخدم زايدكس- اتش سي كريم حال تذكرك ذلك ما لم يكن موعد الجرعة الثانية.

تعليمات الاستخدام:

- ضع طبقة رقيقة وافركها برفق على المنطقة المصابة.
- لا تقم بتغطية المنطقة المصابة إلا إذا أشار الطبيب إلى ذلك.
- لا توقف فترة العلاج الموصوفة لك من تلقاء نفسك.

تنبيه:

للاستعمال الخارجي فقط.

التخزين:

احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 15-30°م، بعيدا عن التجميد.

العبوة:

أنبوب يحتوي على 15 غم كريم.

شركة بيت جالا لصناعة الادوية

شارع المدارس رقم 81

ص . ب 58

بيت جالا- فلسطين

<http://www.beitjalapharma.com>